



Calendrier de vaccination aux TNO

Vaccins recommandés pour les bébés et les enfants

Voici le calendrier de vaccination recommandé de la naissance à l'âge de 17 ans. Il n'est jamais trop tard pour recevoir un vaccin ou pour rattraper un retard. Si vous avez des questions, composez le 811 ou communiquez avec un fournisseur de votre service de santé publique local.

ÂGE	VACCIN
Naissance	HB Hépatite B VRS¹ Virus respiratoire syncytial
1 mois	HB Hépatite B BCG² Bacille de Calmette-Guérin (tuberculose)
2 mois	DCaT-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite (inactivé), <i>Hæmophilus influenzae</i> de type B Men-C-ACYW³ Vaccin quadrivalent conjugué contre le méningocoque (Men-C-ACYW ³) Pneu-C Pneumocoque (conjugué 15-valent) ⁴ Rot-1 et Rot-5⁴ Rotavirus
4 mois	DCaT-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite (inactivé), <i>Hæmophilus influenzae</i> de type B Pneu-C Pneumocoque (conjugué 15-valent) ⁴ Rot-1 et Rot-5⁴ Rotavirus
6 mois	DCaT-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite (inactivé), <i>Hæmophilus influenzae</i> de type B HB Hépatite B Pneu-C Pneumocoque (conjugué 15-valent) ⁴ Rot-5⁴ Rotavirus
12 mois	RROV Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle Men-C-ACYW³ Vaccin quadrivalent conjugué contre le méningocoque (Men-C-ACYW ³)
18 mois	DCaT-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite (inactivé), <i>Hæmophilus influenzae</i> de type B Pneu-C Pneumocoque (conjugué 15-valent) ⁴ RROV Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle
4 à 6 ans	DCaT-VPI Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire) et poliomyélite (inactivé)
4 ^e , 5 ^e ou 6 ^e année	VPH Virus du papillome humain Personnes immunocompétentes : série de deux doses Personnes immunodéprimées : série de trois doses
7 ^e année	TdCa Tétanos, diphtérie, coqueluche (acellulaire)
12 ^e année	Men-C-ACYW-135 Méningocoque (conjugué quadrivalent) ⁵ 4CMenB Méningocoque de type B (non financé par l'État) ⁵
6 mois et plus	Inf Influenza (grippe), offert chaque année. Les enfants de 8 ans ou moins qui reçoivent ce vaccin pour la première fois auront besoin d'une deuxième dose un mois après la première.

1. Pour les bébés de 0 à 3 mois au début et tout au long de la saison du VRS.
2. Le vaccin BCG est maintenant administré aux TNO aux bébés **âgés d'un mois**, après réception des résultats du test de SCID de votre bébé par vous et votre professionnel de la santé. Le vaccin BCG n'est recommandé que pour certains bébés. Parlez à votre professionnel de la santé ou infirmier de santé publique pour en savoir plus.
3. L'administration des vaccins MENVEO^{MD} et NIMENRIX^{MD} est approuvée pour les personnes de moins de 24 mois à l'heure actuelle.
4. Le vaccin conjugué contre le pneumocoque 20-valent (Pneu-C-20) est recommandé pour les enfants présentant un risque accru de contracter une maladie invasive à pneumocoque. Consultez le Guide canadien d'immunisation pour en savoir plus : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/guide-canadien-immunisation.html>.
5. Votre enfant recevra le vaccin en deux (Rot-1) ou trois (Rot-5) doses selon la disponibilité des vaccins à son premier rendez-vous (à deux mois). Il doit recevoir toutes les doses du même vaccin, car ces vaccins ne sont pas interchangeables.
6. Ce vaccin est seulement offert aux élèves de 12^e année qui feront des études postsecondaires et aux recrues militaires qui vivront dans des lieux d'habitation collectifs.

Vaccins financés par l'État pour les adultes

Composez le 811 ou consultez votre professionnel de la santé pour déterminer si ces vaccins sont souhaitables pour vous ou votre enfant.

VACCIN	RECOMMANDATION
COVID-19 Coronavirus 19	Si vous êtes susceptible de contracter une forme grave de la maladie. ¹
HB Hépatite B	Pour ceux qui ne l'ont pas reçue durant l'enfance. Série de trois doses. ¹
VPH Virus du papillome humain	Vaccin financé par l'État jusqu'à l'âge de 26 ans. ¹
Inf Influenza	Chaque année pour toutes les personnes de six mois et plus. ¹
ROR Rougeole, oreillons, rubéole	Pour les adultes nés à partir du 1 ^{er} janvier 1970. ¹
MPOX Variolose simienne	Les personnes susceptibles de contracter une forme grave de la variolose simienne devraient recevoir deux doses à 28 jours d'intervalle. ¹
Pneu-C Vaccin conjugué 20-valent contre le pneumocoque	Pour les personnes de 65 ans et plus. ¹ Pour les personnes de moins de 65 ans à risque de pneumococcie invasive. ¹
TdCa Tétanos, diphtérie, coqueluche	Tous les 10 ans et pour les personnes susceptibles de contracter le tétanos en raison d'une blessure. ¹ Pour protéger les nouveaux-nés de la coqueluche, les femmes enceintes doivent recevoir un vaccin de rappel à chaque grossesse, préféablement entre la 27 ^e et la 32 ^e semaine de grossesse. ¹
Var Varicelle	Pour tous ceux qui n'ont jamais eu la varicelle. ¹

Vaccins non financés par l'État pour les bébés, les enfants et les adultes

- En plus des vaccins financés par l'État aux TNO, d'autres vaccins autorisés peuvent être administrés.
- Selon l'état de santé de la personne, certains de ces vaccins peuvent être offerts gratuitement.

Ces vaccins peuvent vous être facturés. Si vous avez une assurance, vérifiez auprès de votre assureur.

VACCIN	RECOMMANDATION
4CMenB Méningocoque de type B	L'administration de ce vaccin devrait être envisagée pour les personnes de moins de 25 ans qui poursuivront des études postsecondaires ou les recrues militaires qui vivront dans des lieux d'hébergement collectifs. Elle pourrait également être envisagée pour les personnes âgées d'au moins 2 mois qui souhaitent être protégées contre d'autres souches de la maladie à méningocoque.
VPH Virus du papillome humain	L'administration de ce vaccin devrait être envisagée pour les personnes de 27 ans et plus qui sont continuellement à risque d'être exposées au VPH.
VRS Virus respiratoire syncytial	Consultez votre professionnel de la santé. Ce vaccin pourrait être administré à des adultes de plus de 60 ans ou à des femmes enceintes.
HZV Vaccin contre le zona	Pour les adultes de 50 ans et plus. Pourrait être pris en considération pour les personnes d'un plus jeune âge présentant un risque accru de contracter le zona.

Vaccins à des fins de santé et sécurité au travail ou avant un voyage

Prenez un rendez-vous pour les vaccins de voyage de 6 à 8 semaines avant de partir, afin de garantir votre protection.

- D'autres vaccins peuvent être recommandés ou requis pour certains types de travail ou certaines destinations de voyage.
- Parlez à votre employeur pour savoir quels vaccins peuvent être recommandés ou requis pour votre type de travail.
- Composez le 811 ou parlez à l'infirmier de votre centre de santé ou de votre service de santé publique pour savoir quels vaccins peuvent être recommandés ou requis pour voyager à l'extérieur du Canada.

CONSEIL : Vous pouvez assurer le suivi des vaccins que vous recevez à l'aide de cette appli : [L'appli CANImmunize](#).



1. Reportez-vous au Guide canadien d'immunisation : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/guide-canadien-immunisation.html>.

If you would like this information in another official language, contact us at 1-855-846-9601.
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, téléphonez-nous au 1-855-846-9601.