



MISE À JOUR SUR LA COVID-19

Résultats et statistiques | Renseignements généraux



Certaines personnes sont **davantage à risque** de tomber gravement malades ou de subir de graves conséquences en raison de la COVID-19. Vous pouvez être plus à risque si vous :

- êtes une personne âgée, surtout après 60 ans
- n'êtes pas vacciné, êtes partiellement vacciné ou n'avez pas reçu de dose de rappel
- êtes enceinte
- êtes modérément ou gravement immunodéprimé
- présentez l'une des conditions suivantes :
 - Vous avez subi une transplantation d'organe
 - Vous suivez un traitement contre le cancer
 - Hypertension
 - Maladie du cœur
- Maladie des poumons
- Maladie du rein
- Maladie du foie
- Démence
- AVC
- Diabète
- Vous êtes atteint d'obésité (indice de masse corporelle de 40 ou plus)

Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 ou si vous présentez (ou croyez présenter) un risque élevé de conséquences graves en raison de la COVID-19, communiquez avec votre professionnel de la santé pour vous faire évaluer.

Si vous avez été **déclaré positif** à la COVID-19

Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, nous vous recommandons de rester à la maison et de limiter vos contacts. Pendant les dix prochains jours, songez à porter un masque à l'intérieur, à réduire vos contacts (surtout avec les personnes vulnérables), à pratiquer l'éloignement physique, à éviter les activités à haut risque, et à travailler seul, si possible.

- Si vous êtes déclaré positif à l'aide d'un test de dépistage antigénique rapide, il n'est pas nécessaire de passer un test en personne.
- Si vos symptômes sont inquiétants ou si vous ne parvenez pas à les gérer chez vous, rendez-vous dans votre centre de santé local. Il existe des traitements qui réduisent les conséquences graves chez les personnes qui présentent un risque élevé. Pour y être admissible, un professionnel de la santé doit vous évaluer.
- Appelez le **8-1-1** pour obtenir des conseils médicaux non urgents.
- Si vous avez de la difficulté à respirer ou si vos symptômes sont graves, composez le **9-1-1**.



Pour connaître les recommandations en vigueur sur la façon de vous protéger vous et votre collectivité, visitez le <https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/covid-19/recommandations-en-vigueur>

Nombre de conséquences graves de la COVID-19 par période et **par type** en 2022



	Du 1 ^{er} janvier au 31 mars <i>(restrictions de santé publique toujours en vigueur)</i>	Du 1 ^{er} avril au 31 août <i>(levée des restrictions de santé publique)</i>	Du 1 ^{er} septembre au 14 décembre <i>(levée des restrictions de santé publique)</i>
Hospitalisations	44	35	15
Admissions aux soins intensifs	10	4	3
Décès	9	4	1
TOTAL	63	43	19

Définition d'une conséquence grave : hospitalisation, admission aux soins intensifs ou décès.

Depuis le 1^{er} avril 2022, tous les arrêtés de santé publique des TNO liés à la COVID-19 ont été levés; toutefois, les infections à la COVID-19 continueront de se propager aux Territoires du Nord-Ouest (TNO) dans un avenir prévisible. Le Bureau de l'administrateur en chef de la santé publique (BACSP) surveille l'incidence des conséquences graves de l'infection à la COVID-19 aux TNO, et ce rapport en donne un aperçu du 1^{er} janvier 2022 au 14 décembre 2022.



Total des conséquences graves de la COVID-19 par mois

DE JANVIER 2022 À MI-DÉCEMBRE 2022

JANV.	FÉVR.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
22 TOTAL	26 TOTAL	15 TOTAL	15 TOTAL	7 TOTAL	3 TOTAL
JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.
8 TOTAL	10 TOTAL	5 TOTAL	3 TOTAL	5 TOTAL	6* TOTAL



*Avant le 14 décembre 2022

63
CONSEQUENCES GRAVES
Du 1^{er} janvier au 31 mars 2022

~60 %
ÉTAIENT ÂGÉS DE 65 ANS ET PLUS
Du 1^{er} janvier au 31 mars 2022

L'ÂGE MOYEN ÉTAIT DE **61 ANS**

43
CONSEQUENCES GRAVES
Du 1^{er} avril au 31 août 2022

~72 %
ÉTAIENT ÂGÉS DE 65 ANS ET PLUS
Du 1^{er} avril au 31 août 2022

L'ÂGE MOYEN ÉTAIT DE **64 ANS**

19
CONSEQUENCES GRAVES
Du 1^{er} septembre au 14 décembre 2022


~63 %
ÉTAIENT ÂGÉS DE 65 ANS ET PLUS
Du 1^{er} septembre au 14 décembre 2022

L'ÂGE MOYEN ÉTAIT DE **66 ANS**



Pas de différences majeures entre les hommes et les femmes pendant les deux périodes.

Le nombre de conséquences graves de la COVID-19 aux TNO a **diminué** depuis le début de l'année.



Taux de conséquences graves de la COVID-19 par **sexe** et par période pour 10 000 résidents

Hommes

Du 1^{er} janvier au 31 mars : **16,48**
Du 1^{er} avril au 31 août : **8,7**
Du 1^{er} sept. au 14 déc. : **5**

Femmes

Du 1^{er} janvier au 31 mars : **13,34**
Du 1^{er} avril au 31 août : **7,82**
Du 1^{er} sept. au 14 déc. : **3,67**



Taux de conséquences graves de la COVID-19 par **type de région** et par période pour 10 000 résidents

Type de région	Du 1 ^{er} janvier au 31 mars	Du 1 ^{er} avril au 31 août	Du 1 ^{er} septembre au 14 décembre
Collectivités	18,01	2,4	2,37
Centre régional	14,49	4,35	5,78
Yellowknife	14,45	14,95	4,65

Centre régional = Behchoko, Fort Simpson, Fort Smith, Hay River, Inuvik, Norman Wells
Petites collectivités = Aklavik, Colville Lake, Deline, Dettah, Enterprise, FGH, Fort Liard, Fort McPherson, Fort Providence, Fort Resolution, Fort Simpson, Gameti, Jean Marie River, Kakisa, Lutselk'e, Nahanni Butte, Paulatuk, Sochs Harbour, Samba K'e, Tsigehtchic, Tuktoyaktuk, Tulita, Ulukhaktok, Wekweeti, Whati, Wrigley

Taux de conséquences graves de la COVID-19 par **statut vaccinal** et par période pour 10 000 résidents

Statut vaccinal	Du 1 ^{er} janvier au 31 mars	Du 1 ^{er} avril au 31 août	Du 1 ^{er} septembre au 14 décembre
Non vacciné	12,22	2,27	2,16
Partiellement vacciné	3,29	6,89	6,61
Deux doses ou plus	14,4	9,06	4,76

* Tous les tableaux rapportent les taux de conséquences graves pour 10 000 résidents des TNO

Taux de conséquences graves de la COVID-19 **par groupe d'âge** et par période pour 10 000 résidents

Groupe d'âge	Du 1 ^{er} janvier au 31 mars	Du 1 ^{er} avril au 31 août	Du 1 ^{er} sept. au 14 déc.
0 à 4 ans	23,74	0	3,76
5 à 14 ans	0	3,5	0
15 à 29 ans	1,13	3,4	0
30 à 49 ans	3,06	0,76	0
50 à 64 ans	18,23	4,56	6,89
65 à 79 ans	45,18	42,67	25,16
80 ans et plus	299,85	134,93	30,82

80+ Les taux de conséquences graves sont les plus élevés dans le **groupe des personnes âgées**, les taux les plus élevés étant de loin dans le groupe des 80 ans et plus.

On a constaté une **diminution des conséquences graves** dans toutes les régions de janvier à décembre 2022.



Le taux de maladie grave chez les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin ou plus est plus élevé que chez les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées; toutefois, la majorité de la population admissible des TNO a reçu au moins deux doses.

~77 % des Ténos ont reçu la première série de vaccins (une ou deux doses selon le type de vaccin, sans compter les doses de rappel) avant le 4 décembre 2022.
~72 % des Ténos avaient reçu deux doses au début de janvier 2022, un pourcentage qui a augmenté à **~76 %** au 14 août 2022.