

La syphilis est en hausse aux TNO

La syphilis est une infection traitable qui se transmet lors d'un contact sexuel oral, génital ou anal avec une personne infectée. Si elle n'est pas traitée, elle peut causer de graves problèmes de santé, voire la mort.

VOICI CE QU'IL FAUT SAVOIR :



PRÉVENTION

Commencez par réduire le risque de contracter la syphilis : demandez à vos partenaires s'ils sont atteints d'une ITS et assurez-vous de vous protéger, au moyen d'un condom ou d'une digue dentaire, par exemple.



DÉPISTAGE

Toute personne sexuellement active devrait consulter un médecin ou un infirmier afin de passer un test de dépistage de la syphilis. Il s'agit d'une simple prise de sang, qui ne prend que quelques minutes. Il est préférable de se faire dépister avant et après tout rapport avec un nouveau partenaire, et de façon plus régulière si vous entretenez de multiples relations, si vous êtes une personne enceinte ou si vous envisagez de le devenir.



TRAITEMENT


Si le résultat de votre test est positif, le traitement consiste généralement en l'injection de deux doses de pénicilline, administrées lors d'un seul et même rendez-vous.

Si vous avez des questions sur la syphilis ou sur le test de dépistage, composez le 811 pour parler à un professionnel de la santé.


SYMPTÔMES À SURVEILLER

1

SYPHILIS
PRIMAIRE



Plaie indolore sur la bouche



Plaie indolore sur les parties génitales

2

SYPHILIS
SECONDAIRE



Éruption cutanée sans démangeaison



Lésions buccales et mal de gorge



Perte de poids



Fièvre



Douleurs musculaires




Perte des cheveux

3


SYPHILIS
TERTIAIRE



Démence



Lésions aux organes internes



Cécité et surdité

SYPHILIS LATENTE : Aucun symptôme. Ce stade peut perdurer pendant des années.



Les symptômes de la syphilis évoluent avec le temps. Ils peuvent également sembler disparaître sans intervention extérieure, mais l'infection reste présente. Si vous avez eu un rapport sexuel et que vous présentez l'un de ces symptômes, pensez à faire un test de dépistage de la syphilis.

