

Directives D'utilisation

Directives pour l'intervention en cas de surdose d'opioïdes

Le vaporisateur nasal NARCAN^{MC} est un antagoniste des opioïdes pur indiqué dans le cadre d'une utilisation d'urgence visant à inverser les effets d'une surdose d'opioïdes connue ou soupçonnée qui se manifeste par une dépression des voies respiratoires et/ou du système nerveux central.

Le vaporisateur nasal NARCAN^{MC} peut être administré par toute personne sur place (non-professionnel de la santé) avant l'arrivée de l'assistance médicale d'urgence, mais il ne remplace pas des soins médicaux professionnels. Il faut demander de l'assistance médicale d'urgence (en composant le 9-1-1) dès qu'une surdose d'opioïdes est soupçonnée, avant l'administration de naloxone.

Important : Destiné à un usage nasal seulement.

Ne testez pas le vaporisateur nasal NARCAN^{MC} et gardez-le dans sa boîte jusqu'au moment où vous en avez besoin.

1

Déterminez la surdose d'opioïdes



Demandez de l'assistance médicale d'urgence

Vérifiez les signes d'une surdose d'opioïdes :

- La personne NE se réveille PAS après que vous avez crié, secoué ses épaules ou frotté énergiquement la zone centrale de sa poitrine
- La respiration est très lente, irrégulière ou elle a cessé
- La partie centrale de l'oeil est très petite, comme un point

Composez le 9-1-1 ou demandez à quelqu'un de le faire à votre place.

Couchez la personne sur le dos.

2

Administrez le vaporisateur nasal NARCAN^{MC}



Retirez le dispositif de l'emballage. **Ne testez pas le dispositif.** Chaque dispositif ne contient qu'une seule dose.

Inclinez la tête de la personne vers l'arrière et soutenez son cou à l'aide de votre main.

Tenez le dispositif en plaçant votre pouce sous le piston. Placez votre index et majeur de chaque côté de l'embout.

Insérez doucement la pointe de l'embout dans une narine. Vos doigts doivent s'appuyer tout juste contre le nez. Lors de l'administration à un enfant, assurez-vous de l'étanchéité de la surface de contact entre l'embout et la narine.

Appuyez fermement sur le piston à l'aide de votre pouce pour administrer la dose.

Retirez le dispositif de la narine.

3

Évaluez et assistez



Placez la personne sur le côté (position de rétablissement). Surveillez-la attentivement.

Administrez une seconde dose après 2 à 3 minutes si la personne ne s'est pas réveillée ou si sa respiration ne s'est pas améliorée. **Changez de narine d'une dose à une autre.**

Des doses supplémentaires peuvent être administrées toutes les 2 à 3 minutes, lorsqu'elles sont disponibles et requises.

Effectuez une respiration artificielle ou un massage cardiaque jusqu'à ce que l'assistance médicale d'urgence arrive, si vous savez comment faire et si cela est nécessaire.