



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Vaccin quadrivalent conjugué contre le méningocoque (Men-C-ACYW)

Qu'est-ce que le vaccin Men-C-ACYW?

Le vaccin Men-C-ACYW est un moyen sûr et efficace d'éviter que vous ou votre enfant ne tombiez gravement malades en raison de quatre souches différentes (A, C, Y et W-135) de la bactérie responsable des infections à méningocoque. Ce vaccin est composé d'une petite quantité de bactéries mortes qui ne provoquent aucune maladie, mais qui aident le système immunitaire à apprendre à se protéger de la bactérie si celle-ci entre dans le corps.

Qu'est-ce qu'une infection à méningocoque?

Il s'agit d'une infection causée par une bactérie. Les deux formes les plus graves et les plus courantes d'une infection à méningocoque sont la méningite et la septicémie.

La méningite est une infection causant l'inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Les symptômes comprennent :

- Raideur du cou
- Fatigue
- Fièvre
- Maux de tête
- Vomissements
- Crises ou attaques

La septicémie est une infection du sang, parfois qualifiée d'empoisonnement du sang. Lorsque la bactérie pénètre dans le sang, elle se répand dans le corps et infecte des organes comme le cœur, les reins et le cerveau. Parfois létale, la septicémie nécessite des soins urgents.

Une infection à méningocoque peut entraîner des séquelles permanentes, notamment :

- des lésions cérébrales
- une perte auditive
- l'amputation de membres

Une personne atteinte d'une infection à méningocoque peut en mourir, même si elle reçoit un traitement médical rapidement.

La vaccination est le meilleur moyen de vous protéger, vous et votre enfant, contre les infections à méningocoque.

Aux TNO, il est recommandé d'administrer le vaccin Men-C-ACYW à l'âge de 2 mois et de 12 mois.

Il est également recommandé pour toute personne en 12^e année qui prévoit poursuivre des études postsecondaires, ainsi que pour les recrues militaires vivant dans un hébergement collectif.

Comment une infection à méningocoque se propage-t-elle?

La bactérie se propage par contact direct avec les sécrétions respiratoires d'une personne infectée, comme la salive ou le mucus, des façons suivantes :

- Toux
- Éternuements
- Contact avec le visage
- Baisers
- Partage de jouets, d'aliments, de boissons, de bouteilles d'eau et d'instruments de musique

Les nourrissons, les adolescents et les jeunes adultes présentent un risque accru de contracter une infection à méningocoque.

Si vous ne savez pas si vous ou votre enfant devriez recevoir le vaccin Men-C-ACYW, veuillez prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé dans votre région pour en savoir plus sur l'admissibilité à la vaccination.

Qui devrait recevoir le vaccin Men-C-ACYW?

Aux TNO, le vaccin Men-C-ACYW est recommandé pour tous les enfants à l'âge de 2 mois et de 12 mois.

Le vaccin Men-C-ACYW est financé par l'État pour les élèves de 12^e année qui prévoient poursuivre des études postsecondaires, ainsi que pour les recrues militaires qui vivront dans un hébergement collectif. De plus, les personnes vivant avec une immunodéficience ou qui prennent des médicaments immunosuppresseurs sont également admissibles à recevoir le vaccin gratuitement.

Si vous ne faites pas partie de l'une des catégories ci-dessus, vous pourriez tout de même être admissible à recevoir le vaccin, mais des frais pourraient s'appliquer.

Vous pourriez également avoir droit à ce vaccin si vous voyagez dans certaines régions où l'infection invasive à méningocoque est endémique.

Discutez avec votre professionnel de la santé pour en savoir plus.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin Men-C-ACYW?

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent avoir des effets secondaires. Ces effets secondaires, s'ils surviennent, sont généralement légers et disparaissent en quelques jours. Vous pouvez prendre ou donner des médicaments contre la douleur et

la fièvre au besoin. Consultez votre professionnel de la santé pour toute préoccupation ou si vous avez besoin de conseils sur les médicaments à administrer. Les effets secondaires légers sont les suivants : gonflement, rougeur et douleur au site de l'injection du vaccin.

Gonflement, rougeur et douleur à l'endroit où vous avez reçu le vaccin.

Vous pourriez également ressentir les effets secondaires suivants :

- fièvre
- somnolence
- maux de tête
- douleurs musculaires ou articulaires
- éruption cutanée
- irritabilité
- perte d'appétit ou maux d'estomac

Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin Men-C-ACYW?

- Communiquez avec votre professionnel de la santé pour en savoir plus.

Pour obtenir davantage de renseignements sur le vaccin Men-C-ACYW, adressez-vous à votre centre de santé local ou consultez les liens suivants :

- **Calendrier de vaccination aux TNO :**
www.gov.nt.ca/fr/CalendrierdeVaccinationauxTNO
- **Immunisation Canada :**
<https://immunize.ca/fr>
- Pour suivre le calendrier d'immunisation de votre famille et pour recevoir des rappels, téléchargez l'application [CANImmunize](#).

Il est important de rester à la clinique pendant 15 minutes après l'administration d'un vaccin en raison d'une possible réaction allergique grave rare. Celle-ci apparaît peu après l'administration du vaccin et peut se manifester entre autres par de l'urticaire, des troubles respiratoires ou un gonflement de la gorge, de la langue ou des lèvres.

Si vous avez une réaction allergique après avoir quitté le lieu de vaccination, rendez-vous au Service des urgences ou à votre centre de santé local pour être soigné sans délai, ou appelez-les.

Signalez tout effet secondaire grave ou inattendu à votre professionnel de la santé.