



# Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle (RROV)

## Qu'est-ce que le vaccin RROV?

Efficace, sécuritaire et approuvé par Santé Canada, le vaccin RROV empêche votre enfant de tomber gravement malade à cause de l'une de ces maladies. Le vaccin RROV (injection) contient une minuscule quantité de germes affaiblis ne provoquant pas la maladie. Les vaccins permettent au système immunitaire d'apprendre à se protéger contre les maladies.

## Ces maladies sont-elles graves?

La rougeole est un virus causant éruptions cutanées rouges, fièvre, toux, écoulement nasal, yeux rouges et larmolements. Dans certains cas, la rougeole peut provoquer un œdème cérébral entraînant des crises épileptiques, une perte auditive ou même le décès.

La rougeole est un virus qui cause les symptômes suivants : gonflement douloureux des joues et du cou, fièvre, bouche sèche, maux de tête, douleurs aux oreilles, fatigue, douleurs musculaires, perte de l'appétit, problèmes d'élocution, de mastication ou de déglutition. La rougeole peut également entraîner une surdit , une m ningite et une infection des testicules ou des ovaires.

La rub ole est un virus causant des rougeurs et une l g re fi vre, le gonflement des ganglions lymphatiques et des douleurs articulaires et musculaires.

***Le vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rub ole et la varicelle (RROV) est la meilleure fa on de prot ger votre enfant de ces maladies. Tous les enfants de 12 mois   12 ans devraient se faire vacciner. Il est  galement possible d'administrer le vaccin RRO et celui contre la varicelle (Var) s par ment.***

## Chez les femmes enceintes, la rub ole peut d clencher une fausse couche et causer des malformations du b b .

La varicelle est un virus pouvant causer une  ruption cutan e prurigineuse qui ressemble   de petites cloques.

Cette maladie peut  tre grave, voire mortelle, en particulier pour les nouveau-n s et les adultes ayant un syst me immunitaire affaibli.

Les complications de la varicelle peuvent inclure :

- Pneumonie (infection pulmonaire);
- Enc phalite ( d me c r bral);
- Infections bact riennes de la peau.

Une fois que vous contractez le virus de la varicelle, il reste dans votre organisme toute votre vie. Le virus peut redevenir actif chez certaines personnes et provoquer une  ruption cutan e douloureuse   cloques appel e zona.

## Pourquoi devrais-je me faire vacciner?

L'immunisation est la meilleure fa on de vous prot ger contre la rougeole, les oreillons, la rub ole et la varicelle.

En  tant vaccin , vous prot gez  galement les autres; en effet, une personne immunis e est moins susceptible de propager une infection.

La vaccination permet aux femmes enceintes et   leur entourage de prot ger leur f etus et le nouveau-n  des infections.



## Comment se transmettent ces maladies?

Ces virus se propagent facilement par l'air quand une personne infectée tousse ou éternue. Le virus est transmis quand vous respirez des gouttelettes contaminées dans l'air ou touchez une surface infectée. Ces virus peuvent également se propager au contact de la salive d'une personne infectée, par exemple, en s'embrassant, ou en partageant de la nourriture, des boissons, des cigarettes ou des jouets.

La varicelle peut également se transmettre au contact des cloques causées par la varicelle ou le zona.

Une femme enceinte infectée par la varicelle peut transmettre le virus à son bébé avant la naissance ou le transmettre à son nouveau-né.

## Quels peuvent être les effets secondaires du vaccin RROV?

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent avoir des effets secondaires. La plupart des personnes vaccinées n'ont aucun effet secondaire.

Les effets secondaires possibles incluent :

- Douleur;
- Rougeur;
- Gonflement au site d'injection.

Certaines personnes peuvent présenter les symptômes suivants entre 7 et 12 jours après la vaccination :

- Fièvre;
- Éruption cutanée ressemblant à la varicelle ou au zona;
- Gonflement des glandes de la joue et du cou;
- Douleurs articulaires temporaires possibles.

Rarement, les symptômes suivants pourraient apparaître :

- Saignements;
- Inflammation du cerveau;
- Fièvre élevée et crise épileptique.

## Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin RROV?

Parlez à votre fournisseur de soins de santé.

## Qui devrait recevoir le vaccin RROV?

Le vaccin est administré en deux injections conformément au tableau suivant :

Vaccin	Âge					
	À la naissance	À 4 mois	À 1 an	À 18 mois	À 3 ans	De 4 à 17 ans
RROV*			✓		✓	

\* Le vaccin RROV est uniquement administré aux enfants de 12 mois à 12 ans.

Pour en savoir plus sur le vaccin RROV, adressez-vous à votre centre de santé local pour parler à un infirmier en santé publique ou consultez les liens suivants :

- Calendrier d'immunisation des TNO :  
<http://www.hss.gov.nt.ca/fr>
- Immunisation Canada :  
<https://immunize.ca/fr>
- Pour suivre le calendrier d'immunisation de votre famille sur votre téléphone intelligent ou votre tablette, et pour recevoir des rappels, veuillez télécharger l'application CANImmune App au :  
<https://www.canimmunize.ca/fr/home>

Votre centre de santé local est situé à l'adresse ci-dessous.

On peut donner de l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup> et Tempra<sup>MD</sup>) pour traiter la fièvre ou les courbatures.

**Il ne faut JAMAIS donner d'AAS (Aspirin<sup>MD</sup>) aux enfants parce que l'aspirine peut provoquer une maladie grave du foie et du cerveau, le syndrome de Reye.**

**Il est important de rester à la clinique pendant 15 minutes après l'administration d'un vaccin en raison d'une possible réaction allergique grave rare. Il peut s'agir d'une urticaire, de difficultés à respirer, ou d'un gonflement de la gorge, de la langue ou des lèvres.**

Si vous avez une réaction allergique après avoir quitté la clinique, rendez-vous au service des urgences ou à votre centre de santé local pour être soigné sans délai, ou appelez-les.

Signalez tout effet secondaire grave ou inattendu à votre infirmier en santé publique.

Indiquez ici les coordonnées de votre centre de santé.

Une *santé* optimale | Des *soins* optimaux | Un *avenir* prometteur

If you would like this information in another official language, contact us at 1-855-846-9601.  
Si vous voulez ces renseignements dans une autre langue officielle, communiquez avec nous au 1-855-846-9601.