









Calendrier de vaccination aux TNO

Vaccins financés par l'État pour les bébés et les enfants

- Voici le calendrier de vaccination recommandé de la naissance à 17 ans.
- Il n'est jamais trop tard pour commencer les vaccins ou pour rattraper un retard.
- Il peut être nécessaire de suivre un calendrier différent si des vaccins sont retardés ou manqués.
- Si vous avez des questions, communiquez avec votre centre de santé ou votre service de santé publique.

ÂGE	VACCIN
 Naissance	HB Hépatite B
1 mois	HB Hépatite B BCG¹ Bacille de Calmette-Guérin (tuberculose)
 2 mois	DTCa-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite (inactivé), <i>Hæmophilus influenzae</i> de type B Men-C-C Méningocoque (conjugué anti-C) Pneu-C-13 Pneumocoque (conjugué 13-valent) Rot-1 et Rot-5⁴ Rotavirus
4 mois	DTCa-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite (inactivé), <i>Hæmophilus influenzae</i> de type B Pneu-C-13 Pneumocoque (conjugué 13-valent) Rot-1 et Rot-5⁴ Rotavirus
 6 mois	DTCa-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite (inactivé), <i>Hæmophilus influenzae</i> de type B HB Hépatite B Pneu-C-13 Pneumocoque (conjugué 13-valent) Rot-5⁴ Rotavirus
12 mois	RROV Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle Men-C-C Méningocoque (conjugué anti-C)
 18 mois	DTCa-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite (inactivé), <i>Hæmophilus influenzae</i> de type B Pneu-C-13 Pneumocoque (conjugué 13-valent) RROV Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle
4 à 6 ans	DTCa-VPI² Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire) et poliomyélite (inactivé)
 4 ^e , 5 ^e ou 6 ^e année	VPH Virus du papillome humain 9 à 14 ans - deux doses (filles et garçons) 15 ans et plus - trois doses
7 ^e année	TdCa Tétanos, diphtérie, coqueluche (acellulaire)
 12 ^e année	Men-C-ACYW-135² Méningocoque (conjugué quadrivalent)
6 mois et plus	Inf Influenza (grippe), offert chaque année. Les enfants de 8 ans ou moins qui reçoivent ce vaccin pour la première fois auront besoin d'une deuxième dose un mois après la première.
5 ans et plus	COVID-19 Vaccin contre la COVID-19 offert aux enfants de 5 ans et plus. Deux doses administrées dans un intervalle de 21 ou 28 jours pour les 12 ans et plus, et de 8 semaines pour les 5 à 11 ans. ⁴

1. Le BCG est maintenant administré aux TNO aux nouveau-nés âgés d'un mois, après réception des résultats du test de SCID de votre bébé par vous ou votre professionnel de la santé. Le BCG n'est recommandé que pour certains nouveau-nés. Parlez à votre professionnel de la santé ou infirmier de santé publique pour en savoir plus.
2. Ce vaccin est seulement offert aux élèves de 12^e année qui feront des études postsecondaires à l'extérieur des TNO.
3. Votre enfant recevra le vaccin en deux (Rot-1) ou trois (Rot-5) doses selon la disponibilité des vaccins à son premier rendez-vous (à deux mois). Il doit recevoir toutes les doses du même vaccin, car ces vaccins ne sont pas interchangeables.
4. Message aux professionnels de la santé : pour obtenir de l'information sur les doses et le calendrier, consultez le www.hss.gov.nt.ca/professionals-immunization-schedule.

Vaccins financés par l'État pour les adultes

- L'immunisation, ce n'est pas que pour les enfants. Les adultes aussi ont besoin de vaccins.
- Voici les vaccins recommandés pour les adultes; ils peuvent dépendre de l'âge.
- Selon le vaccin, plus d'une dose peut être nécessaire.

VACCIN	RECOMMANDATION
HB Hépatite B	Pour ceux qui ne l'ont pas reçu durant l'enfance
VPH Virus du papillome humain	Pour les femmes et les hommes de 26 ans et moins
Inf Influenza	Chaque année pour toutes les personnes de six mois et plus
COVID-19 Coronavirus 19	2 doses administrées dans un intervalle de 21 ou 28 jours pour les 12 ans et plus, et de 8 semaines pour les 5 à 11 ans. 3 ^e dose administrée 28 jours après la 2 ^e dose pour les personnes immunodéprimées. 3 ^e dose de rappel administrée aux 12 ans et plus 6 mois après la 2 ^e dose. 4 ^e dose de rappel administrée aux personnes de 50 ans et plus, 6 mois après la dernière dose reçue
ROR Rougeole, oreillons, rubéole	Pour les adultes nés à partir du 1 ^{er} janvier 1970
Pneu-P-23 Pneumocoque (polysaccharidique 23-valent)	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les personnes de 65 ans et plus • Pour les personnes de moins de 65 ans à risque de pneumococcie invasive (parlez-en à votre professionnel de la santé)
TdCa Tétanos, diphtérie, coqueluche	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les 10 ans pour tous • Pour protéger les nouveaux-nés de la coqueluche, les femmes enceintes doivent recevoir un vaccin de rappel à chaque grossesse, préférablement entre la 27^e et la 32^e semaine de grossesse.
Var Varicelle	Pour tous ceux qui n'ont jamais eu la varicelle

Ces vaccins peuvent vous être facturés.

Vaccins non financés par l'État pour les bébés, les enfants et les adultes

- En plus des vaccins financés par l'État aux TNO, il existe d'autres vaccins autorisés au Canada qui peuvent être administrés moyennant des frais.
- Selon l'état de santé de la personne, certains de ces vaccins peuvent être offerts gratuitement.
- Discutez avec votre professionnel de la santé ou votre infirmier en santé publique pour savoir si certains de ces vaccins sont recommandés pour vous ou votre enfant.

VACCIN	RECOMMANDATION
4CMenB Méningocoque de type B	Pour les personnes de 2 mois à 24 ans
VPH Virus du papillome humain	Pour les femmes de 27 à 45 ans. Le vaccin n'est pas encore autorisé pour les hommes de plus de 26 ans.
Zos Herpès zoster (zona)	Pour les adultes de 50 ans et plus
Pneu-C-13 Pneumocoque (conjugué 13-valent)	Pour les personnes de 5 ans et plus ayant certains problèmes de santé

Prenez vos rendez-vous de santé pour les voyages au moins six à huit semaines avant votre départ

Vaccins à des fins de santé et sécurité au travail ou avant un voyage

- D'autres vaccins peuvent être recommandés ou requis pour certains types de travail ou certaines destinations de voyage. Pensons entre autres aux vaccins contre : l'hépatite A, la typhoïde, les méningococcies, l'encéphalite japonaise, la maladie du charbon, la rage et la fièvre jaune.
- Parlez à votre employeur pour savoir quels vaccins peuvent être recommandés ou requis pour votre type de travail.
- Parlez à l'infirmier de votre centre de santé ou de votre service de santé publique pour savoir quels vaccins peuvent être recommandés ou requis pour voyager à l'extérieur du Canada.

If you would like this information in another official language, contact us at 1-855-846-9601.
Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, téléphonez-nous au 1-855-846-9601.