



Calendrier de vaccination aux TNO

Vaccins financés par l'État pour les bébés et les enfants

- Voici le calendrier de vaccination recommandé de la naissance à 17 ans.
- Il n'est jamais trop tard pour commencer les vaccins ou pour rattraper un retard.
- Il peut être nécessaire de suivre un calendrier différent si des vaccins sont retardés ou manqués.
- Si vous avez des questions, communiquez avec votre centre de santé ou votre service de santé publique.

JUIN 2017

ÂGE	VACCIN
 Naissance	HB Hépatite B
	BCG¹ Bacille de Calmette-Guérin (tuberculose)
1 mois	HB Hépatite B
 2 mois	DTCa-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite (inactivé), <i>Hæmophilus influenzae</i> de type B
	Men-C-C Méningocoque (conjugué anti-C)
	Pneu-C-13 Pneumocoque (conjugué 13-valent)
	Rot-1 Rotavirus
4 mois	DTCa-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite (inactivé), <i>Hæmophilus influenzae</i> de type B
	Pneu-C-13 Pneumocoque (conjugué 13-valent)
	Rot-1 Rotavirus
 6 mois	DTCa-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite (inactivé), <i>Hæmophilus influenzae</i> de type B
	HB Hépatite B
	Pneu-C-13 Pneumocoque (conjugué 13-valent)
12 mois	RROV Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle
	Men-C-C Méningocoque (conjugué anti-C)
 18 mois	DTCa-VPI-Hib Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite (inactivé), <i>Hæmophilus influenzae</i> de type B
	Pneu-C-13 Pneumocoque (conjugué 13-valent)
3 ans	RROV Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle
4 à 6 ans	DTCa-VPI² Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire) et poliomyélite (inactivé)
 4 ^e , 5 ^e ou 6 ^e année	VPH (filles et garçons) Virus du papillome humain 9 à 14 ans - deux doses 15 ans et plus - trois doses
	TdCa Tétanos, diphtérie, coqueluche (acellulaire)
7 ^e année	
12 ^e année	Men-C-ACYW-135³ Méningocoque (conjugué quadrivalent)
 6 mois et plus	Inf Influenza (grippe), offert chaque année. Les enfants de 8 ans ou moins qui reçoivent ce vaccin pour la première fois auront besoin d'une deuxième dose un mois après la première.

1. Le BCG est seulement recommandé pour certains nouveau-nés. Informez-vous auprès de votre fournisseur de soins de santé ou de votre infirmière en santé publique.

2. Le DTCa-VPI-Hib peut remplacer le DTCa-VPI en cas de pénurie.

3. Ce vaccin est seulement offert aux élèves de 12^e année qui feront des études postsecondaires à l'extérieur des TNO.

Vaccins financés par l'État pour les adultes

- L'immunisation, ce n'est pas que pour les enfants. Les adultes aussi ont besoin de vaccins.
- Voici les vaccins recommandés pour les adultes; ils peuvent dépendre de l'âge.
- Selon le vaccin, plus d'une dose peut être nécessaire.

VACCIN	RECOMMANDATION
HB Hépatite B	Pour ceux qui ne l'ont pas reçu durant l'enfance
VPH Virus du papillome humain	Pour les femmes et les hommes de 26 ans et moins
Inf Influenza	Chaque année pour toutes les personnes de six mois et plus
ROR Rougeole, oreillons, rubéole	Pour les adultes nés à partir du 1 ^{er} janvier 1970
Pneu-P-23 Pneumocoque (polysaccharidique 23-valent)	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les personnes de 65 ans et plus • Pour les personnes de moins de 65 ans à risque de pneumococcie invasive (parlez-en à votre fournisseur de soins de santé)
TdCa Tétanos, diphtérie, coqueluche	Tous les 10 ans pour tous
Var Varicelle	Pour tous ceux qui n'ont jamais eu la varicelle

Ces vaccins peuvent vous être facturés.

Vaccins non financés par l'État pour les bébés, les enfants et les adultes

- En plus des vaccins financés par l'État aux TNO, il existe d'autres vaccins autorisés au Canada qui peuvent être administrés moyennant des frais.
- Selon l'état de santé de la personne, certains de ces vaccins peuvent être offerts gratuitement.
- Discutez avec votre fournisseur de soins de santé ou votre infirmière en santé publique pour savoir si certains de ces vaccins sont recommandés pour vous ou votre enfant.

VACCIN	RECOMMANDATION
4CMenB Méningocoque de type B	Pour les personnes de 2 mois à 17 ans
VPH Virus du papillome humain	Pour les femmes de 27 à 45 ans * Le vaccin n'est pas encore autorisé pour les hommes de cette tranche d'âge.
Zos Herpès zoster (zona)	Pour les adultes de 50 ans et plus
Pneu-C-13 Pneumocoque (conjugué 13-valent)	Pour les personnes de 5 ans et plus ayant certains problèmes de santé

Prenez vos rendez-vous de santé pour les voyages au moins six à huit semaines avant votre départ

Vaccins à des fins de santé et sécurité au travail ou avant un voyage

- D'autres vaccins peuvent être recommandés ou requis pour certains types de travail ou certaines destinations de voyage. Pensons entre autres aux vaccins contre : l'hépatite A, la typhoïde, les méningococcies, l'encéphalite japonaise, la maladie du charbon, la rage et la fièvre jaune.
- Parlez à votre employeur pour savoir quels vaccins peuvent être recommandés ou requis pour votre type de travail.
- Parlez à l'infirmière de votre centre de santé ou de votre clinique de santé publique pour savoir quels vaccins peuvent être recommandés ou requis pour voyager à l'extérieur du Canada.

If you would like this information in another official language, contact us at 1-855-846-9601.

Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, téléphonez-nous au 1-855-846-9601.