



# Vaccin conjugué contre le pneumocoque 13 (Pneu-C-13)

## Qu'est-ce que le vaccin Pneu-C-13?

Efficace, sécuritaire, et approuvé par Santé Canada, le vaccin Pneu-C-13 empêche votre enfant de tomber gravement malade à cause des infections à pneumocoques. Le vaccin Pneu-C-13 (injection) contient une minuscule quantité de germes morts. Les vaccins permettent au système immunitaire d'apprendre à se protéger contre la maladie.

## L'infection à pneumocoques est-elle grave?

Les infections à pneumocoques incluent :

- Pneumonie (infection des poumons);
- Septicémie (infection du sang);
- Méningite (infection de la membrane entourant le cerveau).

Les infections à pneumocoques peuvent entraîner la surdité et parfois le décès.

La pneumonie est une infection grave des poumons qui cause fièvre, toux et problèmes respiratoires. Elle peut être mortelle.

La méningite est une infection provoquant le gonflement de la membrane entourant le cerveau et la moelle épinière. Les symptômes incluent :

- Raideur de la nuque;
- Fatigue;
- Fièvre;
- Maux de tête;

***Le vaccin Pneu-C-13 est la meilleure façon de se protéger contre le pneumocoque. Tous les bébés devraient être vaccinés. Le vaccin serait également utile aux enfants plus grands et aux adultes présentant un état pathologique à risque élevé.***

- Vomissements;
- Crises épileptiques.

La méningite peut être mortelle, même si la personne malade est prise en charge rapidement.

La septicémie est une infection du sang qui peut entraîner l'amputation d'un membre, voire le décès.

## Comment se transmet l'infection à pneumocoques?

L'infection à pneumocoques est causée par une bactérie qui se propage facilement d'une personne à l'autre. Elle se transmet au contact de la salive d'une personne infectée :

- Toux;
- Éternuements;
- Contact direct;
- Baisers;
- Partage de jouets, de nourriture ou de boissons, de cigarettes, de rouge à lèvres, de bouteilles d'eau et d'instruments de musique.



## Pourquoi faire administrer le vaccin Pneu-C-13 à votre enfant?

L'immunisation est la meilleure façon de se protéger contre une infection à pneumocoques.

En vous faisant vacciner, ainsi que votre enfant, vous protégez également les autres; en effet, une personne immunisée est moins susceptible de propager une infection.

Les personnes infectées par la bactérie, mais qui ne tombent pas malades, peuvent quand même transmettre l'infection.

### Quels peuvent être les effets secondaires du vaccin Pneu-C-13?

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent avoir des effets secondaires. La plupart des personnes recevant le vaccin Pneu-C-13 n'ont pas d'effets secondaires.

Les effets secondaires possibles incluent :

- Douleur;
- Rougeur;
- Gonflement au site d'injection.

Autres effets possibles :

- Fièvre;
- Somnolence;
- Maux de tête;
- Douleurs musculaires ou articulaires;
- Éruption cutanée;
- Irritabilité;
- Perte d'appétit ou maux d'estomac.

Ces effets bénins durent habituellement de un à deux jours.

### Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin Pneu-C-13?

Parlez à votre fournisseur de soins de santé.

On peut donner de l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup> et Tempra<sup>MD</sup>) pour traiter la fièvre ou les courbatures.

Il ne faut JAMAIS donner d'AAS (Aspirin<sup>MD</sup>) aux enfants parce que l'aspirine peut provoquer une maladie grave du foie et du cerveau, le syndrome de Reye.

**Il est important de rester à la clinique pendant 15 minutes après l'administration d'un vaccin en raison d'une possible réaction allergique grave rare. Il peut s'agir d'une urticaire, de difficultés à respirer, ou d'un gonflement de la gorge, de la langue ou des lèvres.**

Si vous avez une réaction allergique après avoir quitté la clinique, rendez-vous au service des urgences ou à votre centre de santé local pour être soigné sans délai, ou appelez-les.

Signalez tout effet secondaire grave ou inattendu à votre infirmier en santé publique.

### Qui devrait recevoir le vaccin Pneu-C-13?

Le vaccin Pneu-C-13 est administré aux enfants en quatre injections conformément au tableau suivant :

Vaccin	Âge					
	À la naissance	À 2 mois	À 4 mois	À 6 mois	À 1 an	À 18 mois
Pneu-C-13*		✓	✓	✓		✓

\* On peut également administrer ce vaccin aux enfants plus grands et aux adultes présentant un état pathologique à risque élevé. Consultez votre infirmier en santé publique ou votre médecin pour savoir si vous pourriez bénéficier de ce vaccin.

Pour en savoir plus sur le vaccin Pneu-C-13, adressez-vous à votre centre de santé local pour parler à un infirmier en santé publique ou consultez les liens suivants :

- Calendrier d'immunisation des TNO : <http://www.hss.gov.nt.ca/fr>
- Immunisation Canada : <https://immunize.ca/fr>
- Pour suivre le calendrier d'immunisation de votre famille sur votre téléphone intelligent ou votre tablette, et pour recevoir des rappels, veuillez télécharger l'application CANImmune App au : <https://www.canimmunize.ca/fr/home>

Votre centre de santé local est situé à l'adresse ci-dessous.

Indiquez ici les coordonnées de votre centre de santé.