



Rotavirus (Rot-1)

Qu'est-ce que le vaccin Rot-1?

Efficace, sécuritaire, et approuvé par Santé Canada, le vaccin Rot-1 empêche votre enfant de tomber gravement malade à cause du rotavirus. Le vaccin Rot-1 (injection) contient une minuscule quantité de germes affaiblis ne provoquant pas la maladie. Les vaccins permettent au système immunitaire d'apprendre à se protéger contre la maladie.

Le rotavirus est-il grave?

Le rotavirus, qui cause souvent une infection appelée gastro-entérite ou simplement « gastro », peut causer les symptômes suivants :

- Importante diarrhée liquide;
- Vomissements;
- Fièvre;
- Maux de ventre.

La diarrhée et les vomissements peuvent durer de trois à huit jours, et entraîner une déshydratation grave (perte des liquides organiques).

La déshydratation est particulièrement dangereuse pour les bébés et les jeunes enfants, et elle peut être mortelle si elle n'est pas traitée.

Le vaccin Rot-1 est la meilleure façon de protéger les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans contre les infections à rotavirus. Tous les bébés devraient être vaccinés.

Transmission du rotavirus

Le rotavirus est présent dans les selles des personnes infectées. Il se transmet facilement par la voie oro-fécale au contact des selles d'un enfant infecté, par exemple :

- Couches;
- Jouets;
- Tables à langer;
- Poignées de portes.

Tout objet susceptible d'entrer en contact avec une petite quantité de selles peut être infecté par le rotavirus.

Le rotavirus est un virus résistant. Il peut persister sur les objets pendant plusieurs jours et être transmis par les enfants avant et après qu'ils montrent des signes de la maladie.

Le lavage des mains et l'utilisation de désinfectant ne suffisent pas toujours à se protéger d'une infection à rotavirus.

Pourquoi faire vacciner votre bébé?

L'immunisation est la meilleure façon de protéger votre bébé contre le rotavirus.

En vaccinant votre bébé, vous protégez également les autres; en effet, une personne immunisée est moins susceptible de propager une infection.

Les bébés et les enfants infectés une fois peuvent contracter l'infection de nouveau.



Quels peuvent être les effets secondaires du vaccin Rot-1?

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent avoir des effets secondaires. La plupart des bébés recevant l'injection du vaccin Rot-1 n'ont aucun effet secondaire.

Les effets secondaires possibles incluent :

- Légère diarrhée;
- Irritabilité;
- Maux de ventre;
- Flatulences;
- Éruption cutanée accompagnée de démangeaisons.

Ces effets bénins durent habituellement de un à deux jours.

Il existe un très faible risque d'intussusception (blocage de l'intestin) pouvant survenir au cours de la semaine qui suit l'administration de la première dose du vaccin contre le rotavirus.

Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin Rot-1?

Parlez à votre fournisseur de soins de santé.

On peut donner de l'acétaminophène (Tylenol^{MD} et Tempra^{MD}) pour traiter la fièvre ou les courbatures.

Il ne faut JAMAIS donner d'AAS (Aspirin^{MD}) aux enfants parce que l'aspirine peut provoquer une maladie grave du foie et du cerveau, le syndrome de Reye.

Qui devrait recevoir le vaccin Rot-1?

Le vaccin Rot-1 est administré aux nourrissons en deux injections conformément au tableau suivant :

Vaccin	Âge						
	À la naissance	À 1 mois	À 2 mois	À 4 mois	À 6 mois	À 1 an	De 2 à 17 ans
Rot-1*			✓	✓			

* On ne peut pas administrer ce vaccin aux bébés de plus de 8 mois.

Pour en savoir plus sur le vaccin Rot-1, adressez-vous à votre centre de santé local pour parler à un infirmier de santé publique ou consultez les liens suivants :

- Calendrier d'immunisation des TNO : <http://www.hss.gov.nt.ca/fr>
- Immunisation Canada : <https://immunize.ca/fr>
- Pour suivre le calendrier d'immunisation de votre famille sur votre téléphone intelligent ou votre tablette, et pour recevoir des rappels, veuillez télécharger l'application CANImmune App au : <https://www.canimmunize.ca/fr/home>

Votre centre de santé local est situé à l'adresse ci-dessous.

Il est important de rester à la clinique pendant 15 minutes après l'administration d'un vaccin en raison d'une possible réaction allergique grave rare. Il peut s'agir d'une urticaire, de difficultés à respirer, ou d'un gonflement de la gorge, de la langue ou des lèvres.

Si vous avez une réaction allergique après avoir quitté la clinique, rendez-vous au service des urgences ou à votre centre de santé local pour être soigné sans délai, ou appelez-les.

Signalez tout effet secondaire grave ou inattendu à votre infirmier en santé publique.

Indiquez ici les coordonnées de votre centre de santé.

Une *santé* optimale | Des *soins* optimaux | Un *avenir* prometteur