



# Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche (TdCa)

## Qu'est-ce que le vaccin TdCa?

Efficace, sécuritaire et approuvé par Santé Canada, le vaccin TdCa empêche vous-même et votre enfant de tomber gravement malades à cause de ces maladies. Le vaccin TdCa (injection) contient une minuscule quantité de germes morts. Les vaccins permettent au système immunitaire d'apprendre à se protéger contre la maladie.

**Les femmes enceintes qui ne sont pas immunisées peuvent exposer leur nourrisson à la coqueluche.**

## Ces maladies sont-elles graves?

Le tétanos est provoqué par une toxine provenant d'une bactérie. Il cause des raideurs et des douleurs musculaires et des problèmes respiratoires. Sur dix personnes atteintes de cette maladie, deux en meurent.

La diphtérie est causée par une toxine (poison) provenant de bactéries. Elle forme une membrane épaisse à l'arrière du nez ou de la gorge qui cause des problèmes respiratoires et de déglutition. Sur dix personnes atteintes de cette maladie, environ une personne en mourra.

La coqueluche est causée par une bactérie. Elle est marquée par des quintes de toux spasmodiques qui peuvent durer des mois. Les nourrissons et les enfants

***Le vaccin TdCa reste la meilleure façon de vous protéger du tétanos, de la diphtérie et de la coqueluche pendant l'adolescence et votre vie d'adulte. Tout le monde devrait se faire vacciner à l'adolescence et recevoir une injection de rappel tous les 10 ans.***

ont des difficultés à manger, à boire ou à respirer. Sur 200 nourrissons touchés par la maladie, environ un risque d'en mourir.

## Comment se transmettent ces maladies?

Le tétanos ne se transmet pas d'une personne à l'autre. On trouve les spores du tétanos partout où ils germent :

- Terre;
- Poussière;
- Matières fécales.

Les spores peuvent s'introduire dans le corps par une coupure ou une brûlure sur la peau et causer une infection.



## Pourquoi vous ou votre enfant devriez vous recevoir le vaccin TdCa?

L'immunisation constitue la meilleure façon de se protéger contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche.

En vous faisant vacciner, vous protégez les autres; en effet, une personne immunisée est moins susceptible de propager une infection.

Un nouveau-né aura moins de risque de contracter la coqueluche si la mère et son entourage sont vaccinés.

La diphtérie et la coqueluche se transmettent d'une personne à l'autre par :

- Toux;
- Éternuements;
- Nourriture ou boissons partagées.

La diphtérie cause parfois des lésions cutanées, et tout contact avec celles-ci peut également propager l'infection.

**Quels peuvent être les effets secondaires du vaccin TdCa?**

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent avoir des effets secondaires. La plupart des personnes recevant le vaccin TdCa n'ont aucun effet secondaire.

Les effets secondaires possibles incluent :

- Douleur;
- Rougeur;
- Gonflement au site d'injection.

Autres effets possibles :

- Fièvre;
- Maux de tête;
- Douleurs musculaires ou articulaires;
- Somnolence.

Ces effets bénins durent habituellement de un à deux jours.

On peut donner de l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup> et Tempra<sup>MD</sup>) pour traiter la fièvre ou les courbatures.

Il ne faut JAMAIS donner d'AAS (Aspirin<sup>MD</sup>) aux enfants parce que l'aspirine peut provoquer une maladie grave du foie et du cerveau, le syndrome de Reye.

**Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin TdCa?**

Parlez à votre fournisseur de soins de santé.

**Qui devrait recevoir le vaccin TdCa?**

Le vaccin TdCa est administré en une injection de rappel pour les personnes vaccinées pendant l'enfance conformément aux tableaux présentés à droite.

CALENDRIER POUR LES ENFANTS (17 ans ou moins)					
Vaccin	Âge				
	À la naissance	À 1 an	À 5 ans	Rappel entre 12 et 16 ans	À 17 ans
TdCa				✓	

CALENDRIER POUR LES ADULTES (18 ans ou plus)*					
Vaccin	Pour les adultes n'ayant jamais été vaccinés (3 injections) :				Injection de rappel pour tous les adultes
	1 <sup>re</sup> visite	4 sem. plus tard	8 sem. plus tard	6 à 12 mois plus tard	
TdCa	✓		✓	✓	✓

\* Les femmes enceintes dont la vaccination n'est pas à jour devront se faire administrer un vaccin de rappel à leur 26<sup>e</sup> semaine de grossesse, avant l'accouchement.

Pour en savoir plus sur le vaccin TdCa, adressez-vous à votre centre de santé local pour parler à un infirmier en santé publique ou consultez les liens suivants :

- Calendrier d'immunisation des TNO : <http://www.hss.gov.nt.ca/fr>
- Immunsation Canada : <https://immunize.ca/fr>
- Pour suivre le calendrier d'immunisation de votre famille sur votre téléphone intelligent ou votre tablette, et pour recevoir des rappels, veuillez télécharger l'application CANImmunize App au : <https://www.canimmunize.ca/fr/home>

Votre centre de santé local est situé à l'adresse ci-dessous.

**Il est important de rester à la clinique pendant 15 minutes après l'administration d'un vaccin en raison d'une possible réaction allergique grave rare. Il peut s'agir d'une urticaire, de difficultés à respirer, ou d'un gonflement de la gorge, de la langue ou des lèvres.**

Si vous avez une réaction allergique après avoir quitté la clinique, rendez-vous au service des urgences ou à votre centre de santé local pour être soigné sans délai, ou appelez-les.

Signalez tout effet secondaire grave ou inattendu à votre infirmier en santé publique.

Indiquez ici les  
coordonnées de  
votre centre de  
santé.

Une *santé* | Des *soins* | Un *avenir*  
optimale | optimaux | prometteur

If you would like this information in another official language, contact us at 1-855-846-9601.  
Si vous voulez ces renseignements dans une autre langue officielle, communiquez avec nous au 1-855-846-9601.